


Вариант 3

1. Лыжник спускается с вершины горы к её подножию за 10 минут, а сноубордист – за 6 минут. Спустившись, они тут же поднимаются вверх на подъемнике, а затем сразу же спускаются вновь. В 12:00 они одновременно начали спуск с вершины. Впервые они встретились у подножия в 15:46. Определите время подъема от подножия до вершины.
2. Решите уравнение $(x^2 - 3x + 7)(x^2 + x + 5) = 43$.
3. Найдите натуральное число n , ближайшее к 1026, сумма всех делителей которого (включая 1 и само это число) равна $2n-1$.
4. На плоскости изображён квадрат $n \times n$ клеток. Вершины клеток будем называть узлами. Требуется в этом квадрате уложить трубу (“тёплый пол”) так, чтобы вход был в левом нижнем углу, а выход – в соседнем узле, и при этом труба прошла бы ровно один раз через каждый узел. Трубу разрешается укладывать только по границам клеток. На рисунке изображён пример укладки трубы в квадрате 3×3 . Докажите, что уложить трубу возможно при любом нечётном значении n и невозможно ни при каком чётном n .
 
5. Найдите наименьшее отличное от полного квадрата натуральное число N такое, что десятичная запись числа \sqrt{N} имеет вид: $A,00a_1a_2\dots a_n\dots$, где A – целая часть числа \sqrt{N} , $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ – цифры от 0 до 9.
6. Докажите, что для любого прямоугольного треугольника с длинами катетов a, b , гипотенузой c и углами α, β (α напротив стороны a , β – напротив b) выполняется равенство $a^2 - 2ac \cos(60^\circ + \beta) = b^2 - 2bc \cos(60^\circ + \alpha)$.
7. Запишем подряд все натуральные числа, кратные девяти:
 $9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, \dots$
 У каждого из этих чисел подсчитаем сумму цифр. В результате получим последовательность:
 $9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 18, 9, \dots$
 Найдите сумму первых 450 членов этой последовательности.
8. Найдите три каких-нибудь натуральных числа a, b, c , удовлетворяющих равенству $a^{2015} + b^{2017} = c^{2016}$.